

透析導入期(他院転入時を含む)

FB-110Pβ
QB100ml/min

QB120ml/min

QB150ml/min

FB-150Uβ

OHDFスタート(Alb3.2以上)

GDF-15M
QS:2L/h

QB180ml/min

QS:4L/h

QB200ml/min

75歳以上

75歳以下

GDF-21M
QD:600ml/h

MFX-21E
QD:600ml/h

QB230ml/min

QS:8L/h

FIX-250S

MFX-25S

QB250ml/min

QS:12L/h QD:700ml/h

QB280ml/min

MFX-30S

QB300ml/min

OHDFで
BP低下

NVF-15M
(IHDF)

MFX-15M
QS:2L/h

0.5g/dl以上の急激な低下
QS、QBを1段階条件を下げる

Alb2.8~3.2
経過観察

RLS・掻痒感が強い時

GDF-21(無印)
QS:4L/h

QS:8L/h

QS:12L/h

QS:16L/h

・QBは保持したまま
QS:4L/hから開始。

・各段階の評価期間
最低1ヶ月(Alb確認)
・症状が強ければ
期間以内でもup検討

・効率不良・除去率不足
⇒upフロー(高齢者Kt/v:1.2以上
若年者1.4以上目標)
高齢者は過剰効率とならないよう配慮する
・各段階で1wの評価期間を設ける
・倦怠感/不均衡症状/活力低下⇒down70
・PVPアレルギー保有者に対してはFIX-150S、
FIX-250Sを使用する
・栄養状態が悪い時にはその都度、栄養士
介入
・状況に応じて長時間OHDFも検討